

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES


SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE "PAYS DE LA LOIRE"

10, Rue Le Nôtre - 49044 ANGERS CEDEX - Tél (41) 36.16.55



Grandes cultures

EDITION DE LA STATION "PAYS DE LA LOIRE"
 Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

BULLETIN N° 9 DU 15 JUIN 1984 - TOUS DEPARTEMENTS P1

Sommaire : P 1 → / BLE D'HIVER /

Dessèchement de la première feuille (immédiatement sous l'épi)

On observe dans tous les départements sur plusieurs variétés-mais en particulier sur "Arminda" depuis la récente remontée des températures, un dessèchement du sommet de cette première feuille.

Il s'agit d'un dessèchement d'ordre physiologique dû au déséquilibre entre l'évapotranspiration de cette jeune feuille (actuellement trop intense) et l'absorption de l'eau par les racines (insuffisante).

Il ne faut pas confondre ce phénomène non parasitaire avec :

- des dégâts de septorioses
- des symptômes de phytotoxicité à la suite d'intervention fongicide ou insecticide.

Ce dessèchement physiologique ne peut absolument pas être combattu par une intervention fongicide

TOUS DEPARTEMENTSPUCERONS DES EPIS

On observe localement une remontée spectaculaire des populations de pucerons des épis.

ATTENTION : Bien observer chaque parcelle, certaines sont très atteintes d'autres sont indemnes

- Un traitement se justifie, si un épi sur deux porte au moins un puceron lors de l'épiaison.

- . ce seuil d'intervention est souvent atteint
- . la rentabilité d'un traitement pucerons est fonction de la date d'application : plus on s'éloigne de la pleine épiaison moins le traitement sera rentabilisé.

TOUTES LES INTERVENTIONS FONGICIDES ET INSECTICIDES DOIVENT CESSER
 15 JOURS APRES LE DEBUT DE LA FLORAISON.